

OBSERVATIONS SUR L'ORIGINE DU MIEL.

Par M. l'abbé BOISSIER DE
SAUPAGE, de la Société-
Royale des Sciences de Montpellier;
Membre de l'Académie Impériale
Physico-Botanique & de celle des
Georgo-PHI de Florence.



NISMES,
Chez GAUDE, Libraire.

M. DCC. LXIII.

Avec Approbation & Privilège de l'Académie.





OBSERVATIONS
S U R
L'ORIGINE
D U
M I E L.

O u a faire connoître d'où le
Miel tire son origine, il suf-
fira de développer celle d'un
sel végétal doux ou sucré qui
en est la matière, & qui paroît sous
une forme ou fluide ou visqueuse & en
petites gouttes connues sous le nom
de Mielée.

(*) A l'Assemblée publique de la Société
Royale des Sciences de Montpellier, le 16
Décembre 1762.

A

En effet la Mielée , qu'on appelle aussi miéluse ou miélar , est bien souvent l'unique substance que cueillent les Abeilles pour composer leur Miel ; & il ne paroît pas qu'elles y fassent autre chose que d'en rassembler les parcelles de différents endroits , pour les mettre en réserve dans leurs cellules ; le seul, ou le séjour dans la Ruche perfectionne cette matière & lui donne la consistance requise.

La partie des fleurs que les Bœanistes appellent *Nectarium* , ou vase à Nectar , est le réservoir le plus commun où les Abeilles vont puiser une liqueur , qui au fond , est la même que la Mielée ; mais après que les fleurs , ou au moins que le plus grand nombre est passé , la Mielée proprement dite fournit à ces Mouches industrieuses une récolte abondante qui excède à certains jours leurs besoins , ou leur aridité.

J'ai observé deux sortes de Mielée , qui paroissent d'ailleurs de même nature & dont les Mouches à Miel s'accommodent également ; on verra par

la suite que l'une & l'autre tire la source des végétaux , quoique d'une façon bien différente.

La première espèce , la seule connue des Agriculteurs &c. qui passe pour une sorte de rosée qui tombe sur les arbres , n'est cependant autre chose qu'une transudation ou une transpiration sensible de ce suc doux & mielleux qui après avoir circulé avec la sève dans les différentes parties de certains végétaux , s'en sépare , & va éclore tout préparé , soit au fond des fleurs , soit à la partie supérieure des feuilles (ce qui est notre Mielée) & qui dans certaines plantes se porte avec plus d'abondance , tantôt dans la moelle , telle que celle de la canne à sucre & du Maïs ; tantôt dans la pulpe des fruits charnus , qui dans leur maturité ont plus ou moins de saveur douce , selon que ce suc mielleux est plus ou moins mêlé par d'autres principes , ou plus ou moins développé.

Telle est l'origine de la manne des Frênes & des Erables de Calabre & de Briançon qui découle abondamment

lorsqu'elle est fluide des feuilles & du tronc de ces arbres & qui prend en s'épaississant la forme concrète , sous laquelle elle est communément employée.

J'avois depuis long-temps conjecturé que la Mielée répandue sur les feuilles des arbres de ce pays-ci , n'en étoit qu'une transpiration , quoique la forme des gouttes n'y ressembloit guère & imitât plutôt celle d'une espèce de plaque : en examinant de près différents arbres mielés , le hasard me fit rencontrer sur un Chêne-Vert de la Mielée récente & dans sa forme primitive , qui est celle d'une humeur transpirée : les feuilles étoient couvertes de milliers de globules , ou de menues gouttes arrondies & serrées, sans se toucher cependant ni se confondre ; telles , à peu près , qu'on en voit sur les plantes où un brouillard épais s'est long-temps posé. La position de chaque globule sembloit déjà indiquer & le point d'où il étoit sorti & le nombre des pores ou des glandes de la feuille dans lesquelles ce suc mielleux est préparé : je

mâsûrai que celui-ci avoit cette la-
douceur du Miel ; ce qui suffisoit seul
pour déceler son origine, sans lever
cependant les doutes qu'appeloit un pré-
jugé contraire.

La Mielée d'une Ronce voisine n'é-
toit pas de même : les petites globu-
les ayant sans doute coësue , ou s'é-
tant jointes l'un à l'autre , soit par l'hu-
midité de l'air qui les auroit délayés ;
soit par la chaleur qui eût aidé à les
faire écrouler ; ils formoient de gros-
ses gouttes ou de larges croûtes dont
la matière desséchée étoit devenue par-
là plus visqueuse ; c'est sous ces der-
nières formes qu'on voit communé-
ment la Mielée ; il n'est pas éton-
nant qu'on n'y soupçonne pas de trans-
piration.

Dans la saison où je rencontrai la
Mielée en globules du Chêne-Vert, cet
arbre portoit deux sortes de feuilles ;
les vieilles d'un tissu ferme , telles que
celles du Houx , ou des arbres qui aux
approches de l'Hiver ne se dépouillent
pas ; & les nouvelles encore tendres
& qui avoient poussé depuis peu : il

n'y avoit constamment de Mielée que sur les feuilles d'un an ; cependant ces feuilles étoient couvertes par les touffes de la nouvelle pousse &c. par conséquent à l'abri de toute espèce de brui- ne qui auroit pu tomber : ce qui prouve assez bien , je pense , que la Mielée n'est point étrangère aux feuilles des arbres qui en sont mouillées, ou qu'elle n'y tombe pas d'ailleurs comme on le croit vulgairement ; puisque la nouvelle pousse de nos Chênes qui auroit dû en être touchée la première, comme étant plus exposée, n'en avoit cependant pas la moindre goutte.

La même singularité me frappa dans la Mielée de la ronce : quoique par la conformation de cet arbrisseau toutes ses feuilles soient à-peu-près exposées également à l'air , ou à la chute qui s'y feroit verticalement, il ne paroît de Mielée que sur les vieilles feuilles ; les jeunes n'en avoient pas plus que la nouvelle pousse du Chêne dont nous avons parlé ; le suc mielleux n'ayant pas eu sans-doute un temps suffisant pour être formé dans la partie

tendre de ces végétaux ou pour y être extrait de la sève ; ce n'est l'effet probablement que d'une longue exposition à l'air , peut-être à ses incommodités , & sur-tout au soleil qui doivent être regardés comme les vrais agens de cette sécrétion.

Il y a plus ; les plantes & les arbrisseaux du voisinage de nos arbres Miellés , mais d'une autre espèce & d'une nature peu propre sans doute à la formation du suc dont nous parlons , n'en perçoient pas le moindre vestige ; il n'en paroît point à terre au tour de ces arbres , sur les pierres , sur les Rochers où la Miellée quoique desséchée laisse long-tems des taches , comme nous le verrons plus bas , en parlant d'une autre Miellée qui tombe , mais dont la chute ne se fait jamais de plus haut que des feuilles des arbres ; ce qui est une nouvelle preuve que cette première espèce de manne liquide ne vient point du ciel , ou des nuages comme de la bruine , puisqu'elle se répandroit indifféremment sur toute sorte de corps & qu'elle n'attacheroit point certains

répandre & même quelques-unes de leurs parties à l'exclusion de tout autre.

Il est vrai, & c'est la seule objection qui se présente, il est vrai que la coïse selon les expériences de M^r. du Fay est attirée par certains corps, tandis qu'elle ne l'est point par d'autres : mais on fait que ce météore qui s'élève le plus souvent de terre, voltige toujours dans l'air où il obéit au moindre souffle & à la plus faible attraction & qu'il s'attache au-dessous comme au-dessus des feuilles des arbres ; s'il tombait comme de la braise il mouilleroit indifféremment tous les corps ; l'accélération de sa chute lui feroit surmonter l'obstacle des petites répulsions qu'il trouveroit sur son chemin. On verra d'ailleurs dans la suite de ces Observations que la Mielée réduite en de très menues gouttes par une autre voie bien naturelle, & que je crois jusqu'ici inconnue, n'affecte en tombant aucune sorte de corps par préférence à d'autres & qu'elle adhère sur tous également.

D'anciens Naturalistes dont les Hif-

terieurs étoient les éches, ont long-temps bercé leurs crédules lecteurs de playes de sang & d'autres matières plus solides; celle de la Mielée, qui n'est moins au merveilleux, étoit encore plus aisée à se persuader; puisqu'on ne l'apprenoit guère sur les arbres & entre-aucres sur nos Mûriers (a) que dans le temps où il paroît de gros nuages dans l'air, pendant les chaleurs de Juin & de Juillet: on s'est cependant pas de-là que part la Mielée; les nuages ne concourent dans ce cas à la production qu'en ce qu'ils occasionnent un surcroît de chaleur en réfléchissant vers la terre les rayons du soleil: les chaleurs ordinaires ne font transpirer que les sucs des plantes les plus volatils; au lieu que celle qui est poussée à un plus fort degré exprime les sucs fixes ou plus visqueux tel que celui de la Mielée. (b)

(a) Cet arbre est moins sujet que les autres à être malade; de bien en prend à son Vain à s'être pour qu'il souffre moins; est un poison subtil de mortel.

(b) Les nuages par où le suc melleux se

Ce qui aide encore à l'illusion sur la chute prétendue du haut de l'air , c'est qu'il n'y a que la partie supérieure des feuilles qui en soit mouillée : mais on a vu d'abord que la mouillure n'arrive que sur certaines feuilles, c'est-à-dire , les nouvelles & les grains exposées à cette affluence ne seroit pas l'effet du hasard : on sçait d'ailleurs que c'est sur ce côté de la feuille où les pores sont plus ouverts & plus tranquilles , que se fait la plus grande transpiration des végétaux ; c'est là qu'aboutissent les vaisseaux entrétoires par où s'échappent les humeurs de la plante , de même que les absorbans qui servent à la nutrition , en attirant l'eau de la pluie & des vapeurs répandues dans l'air.

Il est au fond des fleurs fort plus larges probablement ou autrement disposées que ceux des feuilles , puisqu'il y a toujours de ce suc dans les vases à mesure dans quelque-temps que la plante fleurisse & dans la saison la plus défavorable à la transpiration : on se souvient dans les fleurs de l'Arbre-à-chêne pendant les froids de Novembre , & les Abrilles y aillent butiner pour peu qu'elles y fassent sentir par quelque rayon de soleil.

Si l'on assemble les différentes preuves que je viens d'apporter , il passera pour constant , ou je m'en salue , que cette première sorte de Miellée transpire des feuilles de certains arbres & qu'elle n'y tombe pas. Ce seroit fatiguer sans raison cette illustre assemblée & paroître se désoler de la pénétration & des lumières de ceux qui la composent que d'insister encore & de ne cesser de prouver ; je me hâte de passer à l'autre Miellée d'abord annoncée avec celle dont je viens de parler.

On n'avoit point encore observé , que je sache cette seconde espèce l'unique ressource des Abeilles , on peu s'en faire , lorsque le Printemps est passé avec la plupart des fleurs qui l'embellissent & que la Miellée par transpiration ne donne qu'à certains jours de fortes chaleurs.

L'origine de cette seconde Miellée n'est rien moins que céleste , étant produite immédiatement par un insecte vil & hideux , ou qui nous paroît tel ; c'est , puisqu'il faut le nommer , d'un chetif Puceron qu'elle vient ;

& ce n'est encore que la déjection qu'il rend par le derrière & cette déjection fait cependant partie du Miel le plus délicat dont on se régale ; mais sans s'arrêter avec le vulgaire aux noms ou aux préjugés , il est certain que cet excrément , qui est fluide & qui mériteroit plutôt le nom d'élixir , ne cède en rien à ce que l'autre Mielée peut avoir au goût de doux & d'agréable.

Nos Fucres extraient cette liqueur , ou ce qui en forme la matière à travers l'écorce de certains arbres , sans leur nuire d'ailleurs , sans y causer même de difformité , celle qu'en produit l'espèce qui fait enrouer les feuilles & celle dont la piquure fait croître sur les bourgeons de l'Orme & du Thérébinte des galles creuses : ils y restent immobiles plusieurs mois de l'année occupés de leur travail , ou à attirer la sève dont ils se nourrissent.

Nos insectes instruits de bonne-heure de l'espèce de ruche qui leur convient dédaignent ceux qui sont tendres ou récents quoiqu'ils soient plus faciles à

percer & ne s'attachent qu'aux rameaux d'un an dans lesquels ils enfoncent un égaillon qui leur sert en même-temps de trompe & de suçoir.

C'est dans leur estomac ou peut-être dans les dernières voies que ce suc d'abord épais & revêtu sous l'écorce , prend une saveur douce toute pareille , à en juger par le goût , à celle de la Mielée végétale , tant celle qui transpire des feuilles , que celle qui naît dans les Vases à Nectar & si cette dernière a quelque chose de plus , c'est qu'elle se mêle avec l'huile essentielle des fleurs qui donne au Miel ses différens parfums. (c)

Les pucerons sont les seuls animaux que je connoisse qui fabriquent réellement du Miel : leurs viscères en font le vrai laboratoire ; ce mîste ou une bonne partie de la totalité , n'est que

(c) Je plantai à Sauvage , au pied d'un Rocher , une haie de Rosiers ; depuis cette époque , le Miel des Roches qui auparavant n'avoit aucune odeur particulière fut pénétré de celle de cette plante dont les fleurs fournissent long-temps aux Abeilles.

l'excédent ou le résidu de leur nourriture dont ils se débarrassent comme nous l'avons dit, par les voies ordinaires. Les Abeilles à qui l'on voudroit en faire honneur n'y ont de part qu'en qualité de manœuvres dont l'emploi est de ramasser les différentes espèces de Mielées : elles la mettent, comme on fait en entre-pât dans une espèce de pâte qu'elles tiennent près de la bouche, pour la reverser de-là dans leurs alvéoles qui en font le magasin, sans y faire d'ailleurs de changement ou d'allocation qui soit au moins, sensible.

Je l'ai éprouvé bien des fois en pressant entre les doigts le corcelet des Abeilles qui revenoient de leur tâche ; j'ai pris de même à la gorge de ces gros bourdons velus & barbelés de deux ou trois couleurs qui gagent leur vie au même métier ; en me tenant toujours en garde contre l'éguillon, je les obligeois à rendre la liqueur qu'ils venoient de cueillir & d'avaler : la grosse goutte qui leur sortoit à la bouche & que je sucçois sur l'animal mé-

me, étoit d'un jaune clair, transparent & me paroissoit de même qualité que les Mielées ordinaires dont le goût m'étoit familier.

J'ai observé deux espèces de Pucerons qui vivent à découvert sur l'écorce des jeunes branches ; ils sont nls & sans ailes ; je parle des femelles (quelque fois on emploie le nom vulgaire qui désigne l'autre sexe) ; elles sont le gros de la peuplade & sont les seules qui travaillent à la Mielée : chaque Pucemillière a d'ailleurs deux ou trois mâles ailes à sa suite ; ce sont des bouches inutiles qui vivent du travail de leurs Compagnes ; au moins les ai-je toujours vu se promener nonchalamment sur le dos de la troupe femelle, sans s'embarrasser comme elle de s'accrocher sur l'écorce.

L'une & l'autre espèce vit en société & habite par pelotons dans différents coins du même arbre : les Pucerons s'y tiennent serrés l'un contre l'autre tout-au-tour de l'arceau dont ils cachent entièrement l'écorce ; & l'on remarquera qu'ordinairement ils y prom-

sent une attitude qui nous paroîtroit sans doute gênante ; mais chacun a ses usages ; celui de nos Insectes est de s'accrocher sur la branche le ventre en haut & la tête en bas : l'on doit même présumer qu'ils ont pour en user sans , des raisons que je tâcherai de deviner dans un moment.

Nous observerons en attendant que la plus petite des deux espèces participe de la couleur de l'écorce sur laquelle ces Insectes vivent & qui est le plus souvent verdâtre. On les distingue surtout à deux cornes ou filets charnus, droits, immobiles, qui s'élèvent perpendiculairement des parties latérales & inférieures du ventre ou abdomen, une de chaque côté : c'est l'espèce qui habite sur les tiges de ronce & de sureau.

L'autre plus grosse du double, & que j'ai ici principalement en vue, puisqu'elle distille la Mielée que les Abeilles cueillent, est noire & n'a point de cornes comme la précédente ; mais elle est marquée dans cette partie de la peau d'un petit bouton noir & laissant comme du lait.

Prévenu de ce qu'auroient avancé quelques Naturalistes & que j'ai vu depuis répété par d'autres, je croyois que ces cornes portoient au bout, comme de l'alsirent, une liqueur que les Fourmis y alloient sucer : mais en y regardant de près, je reconnus que ce qui attiroit les Fourmis seroit d'ailleurs dans les grands & les petits Pectores, & qu'il n'en seroit pas plus des cornes de ces derniers que de celle que les Chenilles portent sur la queue.

Quelques Abeilles me donnerent lieu de m'éclaircir sur cela : leur bourdonnement au milieu d'une touffe de Chêne-vert me fit soupçonner que quelque insecte pressant les y attiroit. En effet quoique ce ne fût ni la saison de la Miée que je connoissois, ni la place ordinaire, j'en vis avec surprise des feuilles & des branches toutes couvertes au centre de la touffe : c'étoit une petite file pour ces Mouches qui cueilloient tout en bourdonnant les gouttes mielleuses.

La forme singulière de celles-ci at-

cira mes regards & occasionna la petite découverte que je rapporte : au lieu d'étoiles arrondies comme celles qui se-
raient tout simplement tombées ; elles
formoient chacune un petit ovale fort
allongé : il ne me fut pas difficile de
découvrir d'où elles pouvoient partir ,
les feuilles englobées étoient placées au-
dessous d'un de ces effluves ou fourmil-
liers de gros Pucerons noirs ; en les
examinant , j'en appercevois de tous à
sauts qui redressant leur abdomen , se-
soient paroître au bout une petite lar-
me de liqueur transparente & couleur
d'ambre qu'ils lançoient l'instant d'a-
près à quelques pouces loin : j'éprou-
vai en portant à la bouche celles que
j'avois recueillies sur ma main , qu'el-
les avoient le même goût que celles
des feuilles où il en étoit déjà tombé.

Pour occasion de voir la même ma-
nière dans la petite espèce , ou chez
les Pucerons cornus ; ils lancent la
goutte du même endroit , de la même
façon & dans une situation toute pa-
reille.

Cet élançement , au reste , qui donne

seul à la goutte une forme allongée, n'est point d'ailleurs pour les Puceron une chose indifférente ou faite au hasard ; il paroît au contraire avoir été réglé par une sage police pour entretenir la propreté chez ce petit peuple, ou pour garantir de toute salissure & l'Insecte lui-même qui pousse loin cet excrément & les camarades pressés contre lui qui sans cette manœuvre seroient englués & bien-tôt hors d'état d'agir.

On comprend en effet que si la goutte sortoit sans effort, l'Insecte qui s'en délivre étant posé comme nous l'avons dit, le ventre en l'air & la tête en bas, cet excrément retomberoit sur lui le premier avant que les compagnons en fussent échabouffés. Mais suffi à quoi bon dira-t-on une posture si bizarre ? Il y a toute apparence que dans les mœurs des Pucerons elle n'a rien de choquant, qu'elle leur est même nécessaire ; au moins leur est-elle très commode pour lancer la goutte avec avantage.

Pour en juger, on n'a qu'à faire

B 3

attention que leur ventre ou abdomen étant vingt fois plus gros que le reste du corps , c'est à-dire , la tête & le corselet pris ensemble , c'est tout ce qu'ils s'efforcent faire que de le traîner lentement après eux ; or si l'abeille éroit dans une attitude contraire à celle que nous avons vue si lui seroit plus difficile de soulever de bas en haut cette lourde masse , lorsqu'il s'agit de la dégager de la presse , pour que l'expulsion de la goutte franchisse la troupe & passe par de-là ; au lieu qu'ayant la tête en bas & le large ventre y portant à plein , nos Puceons font un bien moindre effort pour le pencher un peu en avant lorsqu'ils sentent quelque besoin : cependant avec tout l'avantage que cette situation leur procure , il paroît qu'ils se donnent encore un tremoulement comme pour canaliser toutes leurs forces.

Je n'ai observé ceci constamment que dans la belle saison ; lorsque l'Hiver approche , le froid ou les playes obligent les Puceons à se ranger du côté de la branche où ils font plus à

l'abri : comme ils ne tirent alors que peu de suc de l'écorce & que les déjections sont rares, ils le placent indifféremment le ventre en haut ou en bas ; la fraîcheur ranimant leur force supplée , peut-être , au désavantage de cette dernière attitude pour relever le vaste abdomen , ou pour ranger l'anus de façon que le voisinage n'en souffre pas : au surplus , tant pis pour celui qui est enclavé ; dans cette fâcheuse saison où la plupart des Patrons ne fait plus que languir , chacun vit & s'amuse comme il peut , ou comme il l'entend.

Les gouttes de la liqueur d'Inacée tombant à terre au défaut des feuilles & des branches , les pierres sont long-temps tachées si la pluie ne vient les laver : c'est la seule espèce de Mûlées qui tombe ; mais sa chute n'arrive jamais au-delà de la portée des branches où les Fourmillières de Patrons sont appliquées.

Cette dernière circonstance & ce qui la précède immédiatement m'ont donné l'explication d'un Phénomène qui

m'avoit autrefois embarrasée. Je passois sous un Tilleul du Jardin du Roi à Paris lorsque je me sentis tomber sur les mains de très menues gouttes que je prenois d'abord pour de la bruite ; je devais cependant en être à couvert sous l'arbre & je l'évitois au contraire en m'en éloignant ; un banc placé au-dessous en étoit tout laissant ; en y allant je sentis une matière gluante ; c'étoit de la Mielée.

Mais ne connoissant alors que celle qui transpire des végétaux ; comment , me disois-je à moi-même , une substance aussi visqueuse peut-elle tomber immédiatement des feuilles en de si petites gouttes , tandis que l'eau de la ploye ne peut s'en détacher & surmonter son adhérence naturelle que lorsqu'elle est en de bien plus grandes masses ? Je n'imaginois point alors la Mielée émise par les Puccrons ; celle-ci étoit alors de leur façon ayant séjé depuis , que le Tilleul est très sujet à cette vermine & que c'est un des arbres qui abondent le plus en cette sorte de suc nuisible.

La Mouche à Miel, n'est pas le seul Insecte , comme nous l'avons déjà insinué qui en fasse ses délices ; les Fourmis ont à ce nectar des droits aussi bien établis & en font tout aussi friandes. Des Naturalistes avoient déjà observé l'appétit de ces dernières, sans connaître le réservoir de ce qui en fait l'objet ; elles tournent au tour des célebens des Pucerons pour épier le moment où tombe leur manne ; bien différentes des Abeilles, les Fourmis qui vivent au jour la journée, ne travaillent, de plus, que pour leur compte ; au moins ne profecions-nous pas d'une exécution de récolte qu'elles fassent.

Deux sortes de Fourmis vont en quête des Pucerons ; chacune a son district séparé & ne va point chasser sur les plaies d'une autre quoique plus faible. Les grosses Fourmis noires des bois ont leur département sur les Pucerons noirs des Chênes & des Chataigniers ; des Fourmis plus petites vont faire leur cour aux Pucerons verts du Sureau ; les pièces des uns & des au-

tres ne sont pas propres à ramasser la Mielée qui est applacée sur les corps où elle tombe; elles l'abandonnent aux Abeilles dont l'atelier est par-dessous, & s'établissent elles-mêmes à la source pour faire l'instare, comme nous l'avons dit, où la liqueur défécée paroit en forme de goutte au bout de l'anneau.

On n'accuse point les Fourmis d'être pacifiques, les nôtres se tiennent aux aguets sans relâche au tour des Pucerons; elles en attendent les momens de faveur avec inquiétude & la bouche béante, ou les pinces ouvertes, pour se précipiter sur la première goutte qui se présentera; si elle leur échape, il faut se résoudre à patienter jusqu'à l'apparition d'une nouvelle où l'on se promet de mieux faire.

Certaines plantes fournissent peu d'extrait à leurs Pucerons; & ce que ces Insectes en rendent est même presque tout enlevé par les petites Fourmis. Il est d'autant plus aisé à ces derniers parasites de ne laisser rien perdre de

l'écoulement liquide que celui des petits Pucerons demeure un peu de temps arrêté à la pointe de l'anus avant d'être poussé au-dehors; ce qui leur donne espérance aux Abeilles de pouvoir rien grappiller après les petites Fourmis.

D'autres arbres tels entre autres, que le Chêne & le Châtaigner fournissent beaucoup plus de cet élixir aux gros Pucerons noirs; sur-tout lorsque ces arbres sont en pleine sève; mais en revanche la goutte excrémentieuse ne s'arrête presque pas; elle part tout aussitôt, & les grosses Fourmis n'y trouvent pas autant à gagner que dans la petite récolte précédente.

C'est une chose plaisante que leur empressement; on les voit courir, s'agiter, aller d'un Puceron à l'autre, tâcher d'atteindre par-tout & s'attraper presque rien; aussi y a-t-il moins de proie pour les Pucerons noirs; la plupart des Fourmis de leur suite se rebutent & l'on en voit à peine trois ou quatre où il en pourroit vivre une trentaine fort à l'aise.

Les Mouches à Miel qui ne semblent vivre que de la fleur, ou de ce qui échappe à la vigilance, ou à l'adresse des groses Fourmis, sont cependant beaucoup mieux servies : ayant des yeux propres à ramasser la Mielée tombée, elles en font d'amples provisions qu'elles ne sauraient consumer elles seules ; si ce désir d'accumuler ne recourait à notre profit, nous serions portés à les taxer d'avarice dont l'Abaille d'ailleurs seroit bien plus semblable que la Fourmi. Le plus grand amas se fait dans la sève abondante de Jais où les Pucerons trouvant de leur côté une nourriture plus facile, succèdent d'autant à travers l'écorce ; de là leur vigueur s'accroît, la population augmente & par une suite naturelle les dépôts deviennent plus grands & plus fréquents. (a)

(a) Ces dépôts sont plus rares en Automne ; j'en ai cependant vu à la fin d'Octobre sur des Châtaignes & des Chênes-blancs qui étoient déjà dépouillés de la moitié de leurs feuilles : d'autres Pucerons qui dans ce même-temps étoient plus exposés à la bise ne cou-

Au reste quoique nos Insectes percent en mille endroits toute l'épaisseur de l'écorce jusqu'à l'Aubier & qu'ils percent les rameaux d'une partie du suc nourricier , l'arbre ne paroît pas s'en ressentir ni les feuilles rien perdre de leur verdure ; l'éguillon ou le faouor dont on s'est servi est si délié qu'on en distingue à peine les traces sur les endroits percés ; ce ne sont que de légères saignées sur un corps plein d'humeur & d'emboisement.

Ce n'est point comme on voit l'histoire des Puemons que j'ai entrepris de faire ; je n'en ai rapporté que ce qui appartenoit à mon sujet. M^{rs}. de Beauvoir & Bonnet de Genève , ont exposé dans de sçavans Mémoires ce que la génération de ces Insectes offroit de curieux & d'intéressant. On sçait en particulier d'après le dernier

deux presque rien , la Mûlle ou les chenilles du ver & des autres insectes travaillent sur les arbres , les Abeilles polissoient celle des Boeuf d'Arboulet qui vivent dans le voisinage où je les voyois assés & obligeant la Mûlle au travail.

que la race Puceronne se reproduit non-seulement enfans de l'accouplement entre les deux sexes ; mais , ce qui doit alors bien étonner , les femelles deviennent fécondes sans avoir eu pendant plusieurs générations de mère en fille (car il faut ici changer les expressions vulgaires) sans avoir eu d'abord la compagne du mâle. Ce sont de vrais Androgynes , & ils le sont beaucoup plus que les Limaçons , qui ayant chacun les deux sexes à la fois ne laissent cependant pas de s'accoupler réciproquement ; & comme si ce n'étoit pas avoir déjà poussé la singularité assez loin , il semble qu'il soit indifférent à nos Pucerons d'être Ovipares comme les oiseaux ou Vivipares comme les quadrupèdes ; ils pondent des œufs dans une saison , ils mettent bas des petits dans une autre.

Mais l'espèce dont nous parlons joint à ces propriétés singulières un avantage ou plutôt un mérite qui doit bien plus nous toucher , c'est celui de nous être utiles ; puisque , sans nuire à nos arbres , elle compose un miel qui fait

fontent l'honneur de nos tables & que les Abeilles , seules chargées de le décorer , ne refusent pas de partager avec nous.

Les gros Pucerons noirs qu'on dédaigne & que les Agriculteurs détruisent même sans pitié & indistinctement avec les espèces nuisibles mériteroient sans doute une autre traitement de leur part , ou même une partie de la faveur qu'ils accordent aux Abeilles pour la Fabrique du Miel ; si l'on cherchoit aucontraire à favoriser la propagation de ces petits animaux dont on méconnoît les bienfaits , on multiplieroit les services qu'ils nous rendent & l'on augmenteroit la récolte que font les Abeilles.

Plus on s'appliquera à connoître les différentes productions de la nature , mieux on s'appercvra que si elles ne tournent pas toutes à notre avantage , elles tendent au moins à d'autres fins qui supposent dans l'auteur souverain qui en est le principe , une intelligence profonde & une sagesse infinie.

OBSERVATION

*D'une Atmosphère de lumière autour
de l'ombre des Corps.*

L'OBSERVATION suivante peut
tenir à des circonstances qui l'ac-
compagnoient & c'est par où j'ai cru
devoir commencer.

Je la fis sur la Chaussée qui con-
duisait à Tours par la route de Poitiers ;
elle traverse une Prairie qui regne le
long des bords de la Loire. C'étoit
au commencement de Mars de mille
sept cent cinquante sept que j'y pas-
sais, sur le soir, avec quelques com-
pagnons de voyage, & toute la troupe
étoit à cheval. Le soleil couchant que
nous avions à gauche projetant nos
ombres à quinze ou vingt pas loin de
nous, les rendoit gigantesques ; elles
se peignoient enfin sur le sol plus bas
que la Chaussée où nous étions d'en-
viron une ou deux toises.

L'ombre dans cet éloignement du
corps

corps qui l'occulté n'est jamais nettement terminée par ses bords ; elle va joindre la partie éclairée par une pénombre , ou une dégradation du sombre au clair. Je m'aperçus au contraire que mon ombre étoit bordée d'une lumière beaucoup plus claire que celle que le soleil répandoit tout au tour du pré , qui faisoit le fond du tableau. Cette lumière formoit une bande de trois ou quatre pouces de largeur qui s'étendoit au-delà de l'ombre & qui en suivoit exactement les contours ; plus vive ou plus forte par le bord intérieur d'où elle sembloit partir , elle s'affaiblissoit insensiblement & se perdoit en-dehors dans la couleur verte du pré éclairée par le soleil.

Je ne saurois mieux comparer cette bordure lumineuse qu'à l'auréole ou au contour de lumière dont les Peintres environnent la tête & quelquefois tout le corps de leurs saints ; ils n'ont pu , je crois , en avoir un modèle plus réel & aussi parfait , si l'on en excepte peut-être ce qu'on appelle la bénédiction dans les expériences modernes

de l'Électricité : la seule différence qu'on pourroit y mettre, c'est que la lumière de mon ombre n'étoit point rayonnante ou qu'elle ne jetoit pas des rayons distincts, isolés & se débordant l'un l'autre, comme le pavois, et ceux de la lumière d'une lampe qu'on voit de loin pendant la nuit.

J'aurois été trop flatté si j'avois eu le privilège exclusif de l'aurole, qui à la vérité, s'étendoit encore sur l'ombre de mon cheval, je ne soupçonnois pas dans les premiers momens que mes compagnons (a) partageassent cet honneur avec moi, ne voyant rien de pareil autour de leur ombre.

Je n'eus rien de plus précis que de les rendre les témoins & les admirateurs de ce Phénomène dont j'étois content de tirer vanité; mais ils me firent d'entrer en m'avouant franchement qu'ils ne voyoient absolument rien de ce qui causoit ma surprise; &

(a) M^{rs}. de Boulogne d'Angoulême. M^r. de Cail de Libourne. Le comte de Cléber M^r. de Chéreau-Brea. M^r. Fossouilleux garde du Roi.

faurois peut-être paillé chez-eux pour un homme à visions s'ils ne s'étoient aperçus sur le champ qu'ils étoient eux-mêmes tout aussi radieux de gloire que je pouvois l'être. Il arrivoit ici dans le physique ce qui n'est pas rare dans le moral, savoir, de s'être frappé que de son mérite propre & d'être insensible à celui d'autrui : chacun de nous voyoit son ombre ornée de cette lumière & n'appercevoit rien autour de celle de son voisin, cette boodure n'existant probablement que pour les yeux placés dans l'ombré même.

Il auroit fallu plus de loisir pour retourner de plusieurs façons & dans ce même endroit, cette observation que je faisois au trot ; différentes circonstances auroient pu me conduire à l'explication, ou m'en faire saisir le fil ; mais on pressoit d'avancer pour arriver au gîte ; la boodure lumineuse qui trotoit avec nous, s'affaiblissant à mesure que le soleil baissoit, disparut enfin avec cet Aube, avant même qu'il plongeât sous l'horizon.

Ce singulier Phénomène n'étoit sô-

rement pas occasionné par une lumière qui seroit réfléchié dessus le contour de nos corps ni par aucune transpiration qui s'en fût exhalée ; puisque ni l'un ni l'autre n'étant pas sensible à la vue dans son origine n'auroit pu se peindre autour de nos ombres , quand bien même un miroir nous enverroit celles-ci : c'étoit plutôt l'effet des réflexions de lumière faites par quelque rosée qui fut sur le pré ; au moins est-il certain que lorsque j'ai cherché à répéter ailleurs cette expérience je n'ai eu aucune apparence sur l'herbe sèche ; au lieu que sur celle qui étoit mouillée de rosée, la tête de mon ombre (mais la tête seule) étoit entourée d'une lumière plus claire à environ un pié & demi ; les gouttes d'eau réfléchissant plus vivement vers mes yeux les rayons du soleil tombés sur un certain espace autour de l'axe de ma tête & sous un certain angle.

Mais cette dernière lumière qu'on peut voir en tout sens sur de la pelouse couverte de rosée & à quelque hauteur que soit le soleil est bien

différente de l'Atmosphère lamineuse du p^{er} de Tours , bien terminée , plus sensible , d'une largeur égale & qui entourant d'ailleurs toute l'ombre doit par conséquent hors de l'axe de la vûe , ce qui fait je crois la plus grande difficulté de l'explication : pour avoir un effet semblable il faudroit rencontrer les mêmes circonstances qui l'accompagnoient et qui est extrêmement rare.

J'en juge par un autre Phénomène d'Optique où il s'agit encore d'ombre , & que je n'ai pu voir qu'une fois , ce fut à Paris ; il y a dix à douze ans qu'étant aux Tuileries je m'apperçus que toutes les ombres des corps quelconques formées par le soleil couchant étoient bleues ; je le fis remarquer aux personnes avec qui je me promenois , & j'appreis quelque-temps après que M^r. de Buffon avoit fait une pareille observation. Je retournai deux ou trois fois à quelque temps de-là au même endroit à la même heure & dans des circonstances que je croyois semblables ; les ombres furent comme à l'ordinaire ;

(18)

le bleu ne reparut plus, peut-être fal-
loit-il rencontrer pour cette couleur-
ci une certaine mesure, ou même une
qualité de vapeur qui intercepta tels
ou tels rayons et que différents accidens
peuvent faire varier d'un jour, ou peut-
être, d'une heure à l'autre.

F I N.

